



Dogalicious

狗胰臟炎食譜大全

20 個低脂自製鮮食配方 · 分兩個脂肪級別

全部符合 AAFCO 成犬維持期標準

關於這本書

「以後要食低脂」 - 大部分主人由獸醫診所走出來，記得的就是這一句。但低脂到底是多低？街市買甚麼肉才算安全？煮出來的東西營養夠不夠？這一頁把數字寫清楚，再給你 20 個可以在香港廚房煮得出來的配方。

先講最重要的一點：脂肪。膳食脂肪是引發及誘發胰臟炎最主要的飲食因素，控制脂肪就是整個餐單的核心。一般成犬糧每 1000 千卡約有 40 至 60 克脂肪；本書康復期配方壓到 14 至 18 克，長期管理配方 18 至 24 克。

第二點同樣重要：胰臟炎只需要控制脂肪，其他營養素完全不需要妥協。配合兩款補充品之後，本書 20 個配方全部達到 AAFCO 成犬維持期營養標準的所有最低要求，可以長期作為主糧。這一點與腎病餐單很不同 - 腎病餐單必須刻意偏離標準，胰臟炎餐單不用。

急性發作期必須即時求診。本書配方為康復期及長期管理而設，不適用於急性發作（嘔吐、腹痛、弓背、不肯進食）。開始任何新餐單前，請先與獸醫確認。

重要：本書所有配方均符合 **AAFCO 成犬維持期標準**，可以長期餵飼，這一點與腎病餐單不同 - 胰臟炎需要控制的是脂肪，其他營養素不需要犧牲。但胰臟炎本身必須由獸醫診斷及跟進。**急性發作期間請立即求診**，那時狗狗需要的是治療，不是新食譜。轉換餐單前請先與獸醫商討，並按指示定期覆檢。



怎樣使用這本書

1. 先由獸醫確認診斷，再選擇對應的半本書：剛康復或病情較嚴重，用前十個超低脂配方；情況穩定後，可轉用後十個低脂配方。
2. 每個配方都附有營養分析（每 1000 千卡）並列明脂肪水平，方便你和獸醫核對。
3. 兩款補充品的份量因配方而異，請以該配方的表格為準，不要套用其他配方的數字。
4. 配方中的葵花籽油必須用量匙準確量度，切勿隨手倒。它是必需脂肪酸的來源，但多倒一點就會推高脂肪，令整個低脂設計失去意義。

本書營養數值為按美國農業部食物成分資料庫計算的估算值，內容僅供一般參考，不能取代獸醫的專業意見。胰臟炎的治療方案必須由獸醫按個別情況制定。© Dogalicious 2026

康復期配方（超低脂）



康復期・超低脂 01 / 20

雞胸肉薯仔餐（胰臟炎康復期）

胰臟炎最折磨主人的地方，是那句「以後要食低脂」之後就沒有下文了 -

低脂到底是多低？這一頁給你數字。這個配方每 1000 千卡只有 15 克脂肪，而一般成犬糧大約是 40 至 60 克。雞胸肉配薯仔，是最容易入手的第一個配方。

本配方屬康復期（極低脂）組別。脂肪嚴格控制在每 1000 千卡 15 克 - 一般成犬糧約 40 至 60 克，即是說本配方大約只有三分之一。脂肪是引發胰臟炎的主要飲食因素，控制脂肪是整個餐單的核心。蛋白質為 130 克，以低脂高生物價來源為主；碳水化合物選用高消化率的薯仔，膳食纖維只有 8.2 克，屬低渣設計，減輕消化負擔。

材料（標準批量）

食材	份量	處理
雞胸肉	1.95 公斤	切粒，去除所有可見脂肪
薯仔	1.4 公斤	去皮切粒
紅蘿蔔	200 克	切細粒
蛋白	200 克（約 6 隻蛋的蛋白）	只用蛋白，蛋黃脂肪高不可使用
葵花籽油	5 克（約 1.1 茶匙）	熄火後拌入，份量必須準確

本批量煮成後約 3.1 公斤（能量約 3,611 千卡）。

製作步驟

1. 薯仔放入大湯鍋，加水蓋過，大火煮滾後轉中火煮 12 分鐘。
2. 加入雞胸肉，中火煮 10 至 12 分鐘至完全熟透。全程用水煮，切勿用油煎。
3. 加入紅蘿蔔再煮 5 分鐘至軟身。

4. 蛋白打散，熄火後徐徐倒入並不斷攪拌，利用餘溫令蛋白凝固成絮狀。
5. 拌入葵花籽油。份量請用量匙準確量度 - 這是配方唯一的油脂來源，多一點都會推高脂肪比例。
6. 連湯汁一起攤凍，按配量表分裝：3 日份量冷藏，其餘冷凍。

營養分析 (每 1000 千卡，未計補充品)

項目	每 1000 千卡	參考
脂肪	15 克	本組上限 18 克 (一般成犬糧約 40 至 60)
粗蛋白質	130 克	AAFCO 最低 45 克
碳水化合物	78 克	-
膳食纖維	8.2 克	低渣易消化
亞麻油酸 (必需脂肪酸)	3.3 克	AAFCO 最低 3.3 克
鈣 / 磷	1,250 / 1,033 毫克	鈣磷比 1.21:1

加入 蛋殼鈣粉 (每 1000 千卡約 3.0 克) 及 狗狗全方位保健粉 (每 1000 千卡約 8.8 克) 後，本配方已達到 AAFCO 成犬維持期營養標準的所有最低要求，可以長期作為主糧。這一點與腎病餐單不同：胰臟炎只需要控制脂肪，其他營養素完全不需要妥協。配方中的葵花籽油份量經過計算，用以達到必需脂肪酸 (亞麻油酸) 的最低要求，請勿省略。

餵飼及補充品配量表 (每日兩餐)

體重	每日能量需求	每日食量	本批可供	全方位保健粉 (每餐)	蛋殼鈣粉 (每餐)
3 公斤	251 千卡	約 210 克	約 14 日	1.1 克	0.4 克 (約 1/8 茶匙)
5 公斤	368 千卡	約 310 克	約 10 日	1.6 克	0.6 克 (約 1/4 茶匙)
10 公斤	619 千卡	約 530 克	約 6 日	2.7 克	0.9 克 (約 3/8 茶匙)
20 公斤	1,040 千卡	約 890 克	約 3 日	4.6 克	1.6 克 (約 5/8 茶匙)
30 公斤	1,410 千卡	約 1,210 克	約 3 日	6.2 克	2.1 克 (約 7/8 茶匙)

注意事項

- 脂肪是胰臟炎飲食的關鍵。切勿另加任何油 (配方指定的葵花籽油除外)、牛油、肥肉、雞皮、動物內臟、芝士或奶類製品 - 一次意外的高脂餐就足以觸發復發。
- 建議少量多餐：每日分 3 至 4 餐，比一日兩餐更能減輕胰臟負擔。下表以每日兩餐計算，如分四餐請把每餐份量減半。
- 急性發作期必須即時求診 (嘔吐、腹痛、弓背、不肯進食)。本書配方為康復期及長期管理而設，不適用於急性期。
- 迷你雪納瑞、貴婦犬等容易有高血脂的品種，長期維持低脂飲食特別重要。
- 轉換餐單以 7 日漸進過渡，期間留意嘔吐、腹瀉、食慾及精神狀態。
- 建議定期覆檢胰特異性脂肪酶 (cPLI) 及三酸甘油脂，並按獸醫指示調整脂肪水平。
- 本配方為體重正常的成犬而設；同時有其他疾病 (如腎病、糖尿病) 的狗狗，請先諮詢獸醫。



康復期・超低脂 02 / 20

火雞胸番薯餐（胰臟炎康復期）

火雞胸是全書最瘦的家禽選擇之一，比雞胸再低一點脂肪。配番薯的天然甜味，對剛病癒、胃口未完全回復的狗狗特別有用 - 願意吃，才是康復的第一步。

本配方屬康復期（極低脂）組別。脂肪嚴格控制在每 1000 千卡 16 克 - 一般成犬糧約 40 至 60 克，即是說本配方大約只有三分之一。脂肪是引發胰臟炎的主要飲食因素，控制脂肪是整個餐單的核心。蛋白質為 140 克，以低脂高生物價來源為主；碳水化合物選用高消化率的番薯，膳食纖維只有 10.0 克，屬低渣設計，減輕消化負擔。

材料（標準批量）

食材	份量	處理
火雞胸肉	1.65 公斤	切粒，去皮
番薯	1 公斤	去皮切粒
南瓜	200 克	去皮去籽切粒
葵花籽油	15 克（約 3.3 茶匙）	熄火後拌入，份量必須準確

本批量煮成後約 2.3 公斤（能量約 2,590 千卡）。

製作步驟

1. 番薯放入大湯鍋，加水蓋過，大火煮滾後轉中火煮 12 分鐘。
2. 加入火雞胸肉，中火煮 10 至 12 分鐘至完全熟透。全程用水煮，切勿用油煎。
3. 加入南瓜再煮 5 分鐘至軟身。
4. 拌入葵花籽油。份量請用量匙準確量度 - 這是配方唯一的油脂來源，多一點都會推高脂肪比例。
5. 連湯汁一起攤凍，按配量表分裝：3 日份量冷藏，其餘冷凍。

營養分析 (每 1000 千卡，未計補充品)

項目	每 1000 千卡	參考
脂肪	16 克	本組上限 18 克 (一般成犬糧約 40 至 60)
粗蛋白質	140 克	AAFCO 最低 45 克
碳水化合物	69 克	-
膳食纖維	10.0 克	低渣易消化
亞麻油酸 (必需脂肪酸)	6.0 克	AAFCO 最低 3.3 克
鈣 / 磷	1,398 / 1,165 毫克	鈣磷比 1.20:1


加入 蛋殼鈣粉 (每 1000 千卡約 3.3 克) 及 狗狗全方位保健粉 (每 1000 千卡約 7.6 克) 後，本配方已達到 AAFCO 成犬維持期營養標準的所有最低要求，可以長期作為主糧。這一點與腎病餐單不同：胰臟炎只需要控制脂肪，其他營養素完全不需要妥協。配方中的葵花籽油份量經過計算，用以達到必需脂肪酸 (亞麻油酸) 的最低要求，請勿省略。

餵飼及補充品配量表 (每日兩餐)

體重	每日能量需求	每日食量	本批可供	全方位保健粉 (每餐)	蛋殼鈣粉 (每餐)
3 公斤	251 千卡	約 220 克	約 10 日	1.0 克	0.4 克 (約 1/8 茶匙)
5 公斤	368 千卡	約 330 克	約 7 日	1.4 克	0.6 克 (約 1/4 茶匙)
10 公斤	619 千卡	約 550 克	約 4 日	2.4 克	1.0 克 (約 3/8 茶匙)
20 公斤	1,040 千卡	約 930 克	約 2 日	3.9 克	1.7 克 (約 5/8 茶匙)
30 公斤	1,410 千卡	約 1,260 克	約 2 日	5.3 克	2.3 克 (約 7/8 茶匙)

注意事項

- 脂肪是胰臟炎飲食的關鍵。切勿另加任何油 (配方指定的葵花籽油除外)、牛油、肥肉、雞皮、動物內臟、芝士或奶類製品 - 一次意外的高脂餐就足以觸發復發。
- 建議少量多餐：每日分 3 至 4 餐，比一日兩餐更能減輕胰臟負擔。下表以每日兩餐計算，如分四餐請把每餐份量減半。
- 急性發作期必須即時求診 (嘔吐、腹痛、弓背、不肯進食)。本書配方為康復期及長期管理而設，不適用於急性期。
- 迷你雪納瑞、貴婦犬等容易有高血脂的品種，長期維持低脂飲食特別重要。
- 轉換餐單以 7 日漸進過渡，期間留意嘔吐、腹瀉、食慾及精神狀態。
- 建議定期覆檢胰特異性脂肪酶 (cPLI) 及三酸甘油脂，並按獸醫指示調整脂肪水平。
- 本配方為體重正常的成犬而設；同時有其他疾病 (如腎病、糖尿病) 的狗狗，請先諮詢獸醫。



康復期・超低脂 03 / 20

鱈魚白飯餐（胰臟炎康復期）

鱈魚是全書脂肪最低的蛋白質，每 100 克只有 0.5

克脂肪。配白米這個最易消化的碳水化合物，就是最接近獸醫處方低脂餐的一碗 - 溫和、清淡、好消化。

本配方屬康復期（極低脂）組別。脂肪嚴格控制在每 1000 千卡 14 克 - 一般成犬糧約 40 至 60 克，即是說本配方大約只有三分之一。脂肪是引發胰臟炎的主要飲食因素，控制脂肪是整個餐單的核心。蛋白質為 88 克，以低脂高生物價來源為主；碳水化合物選用高消化率的白米，膳食纖維只有 4.5 克，屬低渣設計，減輕消化負擔。

材料（標準批量）

食材	份量	處理
鱈魚柳	1.35 公斤	可請魚檔代為起肉
白米	400 克	洗淨
節瓜	600 克	去皮切粒
蛋白	200 克（約 6 隻蛋的蛋白）	只用蛋白，蛋黃脂肪高不可使用
葵花籽油	30 克（約 6.7 茶匙）	熄火後拌入，份量必須準確

本批量煮成後約 2.9 公斤（能量約 2,800 千卡）。

製作步驟

1. 白米放入大湯鍋，加水蓋過，大火煮滾後轉中火煮 12 分鐘。
2. 加入鱈魚柳，中火煮 10 至 12 分鐘至完全熟透。全程用水煮，切勿用油煎。
3. 加入節瓜再煮 5 分鐘至軟身。
4. 蛋白打散，熄火後徐徐倒入並不斷攪拌，利用餘溫令蛋白凝固成絮狀。
5. 拌入葵花籽油。份量請用量匙準確量度 - 這是配方唯一的油脂來源，多一點都會推高脂肪比例。
6. 連湯汁一起攤凍，按配量表分裝：3 日份量冷藏，其餘冷凍。

營養分析 (每 1000 千卡，未計補充品)

項目	每 1000 千卡	參考
脂肪	14 克	本組上限 18 克 (一般成犬糧約 40 至 60)
粗蛋白質	88 克	AAFCO 最低 45 克
碳水化合物	122 克	-
膳食纖維	4.5 克	低渣易消化
亞麻油酸 (必需脂肪酸)	7.5 克	AAFCO 最低 3.3 克
鈣 / 磷	1,812 / 1,510 毫克	鈣磷比 1.20:1

加入 蛋殼鈣粉 (每 1000 千卡約 4.4 克) 及 狗狗全方位保健粉 (每 1000 千卡約 8.3 克) 後，本配方已達到 AAFCO 成犬維持期營養標準的所有最低要求，可以長期作為主糧。這一點與腎病餐單不同：胰臟炎只需要控制脂肪，其他營養素完全不需要妥協。配方中的葵花籽油份量經過計算，用以達到必需脂肪酸 (亞麻油酸) 的最低要求，請勿省略。

餵飼及補充品配量表 (每日兩餐)

體重	每日能量需求	每日食量	本批可供	全方位保健粉 (每餐)	蛋殼鈣粉 (每餐)
3 公斤	251 千卡	約 260 克	約 11 日	1.0 克	0.6 克 (約 1/4 茶匙)
5 公斤	368 千卡	約 390 克	約 8 日	1.5 克	0.8 克 (約 3/8 茶匙)
10 公斤	619 千卡	約 650 克	約 5 日	2.6 克	1.4 克 (約 1/2 茶匙)
20 公斤	1,040 千卡	約 1,090 克	約 3 日	4.3 克	2.3 克 (約 7/8 茶匙)
30 公斤	1,410 千卡	約 1,480 克	約 2 日	5.8 克	3.1 克 (約 1 1/4 茶匙)

注意事項

- 脂肪是胰臟炎飲食的關鍵。切勿另加任何油 (配方指定的葵花籽油除外)、牛油、肥肉、雞皮、動物內臟、芝士或奶類製品 - 一次意外的高脂餐就足以觸發復發。
- 建議少量多餐：每日分 3 至 4 餐，比一日兩餐更能減輕胰臟負擔。下表以每日兩餐計算，如分四餐請把每餐份量減半。
- 急性發作期必須即時求診 (嘔吐、腹痛、弓背、不肯進食)。本書配方為康復期及長期管理而設，不適用於急性期。
- 迷你雪納瑞、貴婦犬等容易有高血脂的品種，長期維持低脂飲食特別重要。
- 轉換餐單以 7 日漸進過渡，期間留意嘔吐、腹瀉、食慾及精神狀態。
- 建議定期覆檢胰特异性脂肪酶 (cPLI) 及三酸甘油脂，並按獸醫指示調整脂肪水平。
- 本配方為體重正常的成犬而設；同時有其他疾病 (如腎病、糖尿病) 的狗狗，請先諮詢獸醫。



康復期・超低脂 04 / 20

狹鱈薯仔餐（胰臟炎康復期）

狹鱈（明太魚）在香港的凍肉店和超市都買得到，價錢比鱈魚親民得多，脂肪同樣極低。長期餵低脂餐最怕的是成本，這一款正好解決這個問題。

本配方屬康復期（極低脂）組別。脂肪嚴格控制在每 1000 千卡 14 克 - 一般成犬糧約 40 至 60 克，即是說本配方大約只有三分之一。脂肪是引發胰臟炎的主要飲食因素，控制脂肪是整個餐單的核心。蛋白質為 139 克，以低脂高生物價來源為主；碳水化合物選用高消化率的薯仔，膳食纖維只有 8.3 克，屬低渣設計，減輕消化負擔。

材料（標準批量）

食材	份量	處理
狹鱈柳（明太魚）	2.1 公斤	解凍後切件
薯仔	1 公斤	去皮切粒
四季豆	200 克	切段
葵花籽油	20 克（約 4.4 茶匙）	熄火後拌入，份量必須準確

本批量煮成後約 2.7 公斤（能量約 2,809 千卡）。

製作步驟

1. 薯仔放入大湯鍋，加水蓋過，大火煮滾後轉中火煮 12 分鐘。
2. 加入狹鱈柳（明太魚），中火煮 10 至 12 分鐘至完全熟透。全程用水煮，切勿用油煎。
3. 加入四季豆再煮 5 分鐘至軟身。
4. 拌入葵花籽油。份量請用量匙準確量度 - 這是配方唯一的油脂來源，多一點都會推高脂肪比例。
5. 連湯汁一起攤凍，按配量表分裝：3 日份量冷藏，其餘冷凍。

營養分析 (每 1000 千卡，未計補充品)

項目	每 1000 千卡	參考
脂肪	14 克	本組上限 18 克 (一般成犬糧約 40 至 60)
粗蛋白質	139 克	AAFCO 最低 45 克
碳水化合物	73 克	-
膳食纖維	8.3 克	低渣易消化
亞麻油酸 (必需脂肪酸)	4.9 克	AAFCO 最低 3.3 克
鈣 / 磷	1,983 / 1,652 毫克	鈣磷比 1.20:1

加入 蛋殼鈣粉 (每 1000 千卡約 4.0 克) 及 狗狗全方位保健粉 (每 1000 千卡約 7.9 克) 後，本配方已達到 AAFCO 成犬維持期營養標準的所有最低要求，可以長期作為主糧。這一點與腎病餐單不同：胰臟炎只需要控制脂肪，其他營養素完全不需要妥協。配方中的葵花籽油份量經過計算，用以達到必需脂肪酸 (亞麻油酸) 的最低要求，請勿省略。

餵飼及補充品配量表 (每日兩餐)

體重	每日能量需求	每日食量	本批可供	全方位保健粉 (每餐)	蛋殼鈣粉 (每餐)
3 公斤	251 千卡	約 240 克	約 11 日	1.0 克	0.5 克 (約 1/4 茶匙)
5 公斤	368 千卡	約 360 克	約 8 日	1.5 克	0.7 克 (約 1/4 茶匙)
10 公斤	619 千卡	約 600 克	約 5 日	2.4 克	1.2 克 (約 1/2 茶匙)
20 公斤	1,040 千卡	約 1,010 克	約 3 日	4.1 克	2.1 克 (約 7/8 茶匙)
30 公斤	1,410 千卡	約 1,370 克	約 2 日	5.5 克	2.8 克 (約 1 1/8 茶匙)

注意事項

- 脂肪是胰臟炎飲食的關鍵。切勿另加任何油 (配方指定的葵花籽油除外)、牛油、肥肉、雞皮、動物內臟、芝士或奶類製品 - 一次意外的高脂餐就足以觸發復發。
- 建議少量多餐：每日分 3 至 4 餐，比一日兩餐更能減輕胰臟負擔。下表以每日兩餐計算，如分四餐請把每餐份量減半。
- 急性發作期必須即時求診 (嘔吐、腹痛、弓背、不肯進食)。本書配方為康復期及長期管理而設，不適用於急性期。
- 迷你雪納瑞、貴婦犬等容易有高血脂的品種，長期維持低脂飲食特別重要。
- 轉換餐單以 7 日漸進過渡，期間留意嘔吐、腹瀉、食慾及精神狀態。
- 建議定期覆檢胰特异性脂肪酶 (cPLI) 及三酸甘油脂，並按獸醫指示調整脂肪水平。
- 本配方為體重正常的成犬而設；同時有其他疾病 (如腎病、糖尿病) 的狗狗，請先諮詢獸醫。



康復期・超低脂 05 / 20

鱸魚白飯餐（胰臟炎康復期）

街市買一條鱸魚，請魚檔代為起肉，回家蒸熟拆肉 -

這大概是香港人最熟悉的煮法。白身魚低脂、易消化，蛋白質質素高，對胰臟的負擔極輕。

本配方屬康復期（極低脂）組別。脂肪嚴格控制在每 1000 千卡 14 克 - 一般成犬糧約 40 至 60 克，即是說本配方大約只有三分之一。脂肪是引發胰臟炎的主要飲食因素，控制脂肪是整個餐單的核心。蛋白質為 89 克，以低脂高生物價來源為主；碳水化合物選用高消化率的白米，膳食纖維只有 3.1 克，屬低渣設計，減輕消化負擔。

材料（標準批量）

食材	份量	處理
鱸魚（起肉）	1.8 公斤	可請魚檔代為起肉
白米	600 克	洗淨
南瓜	600 克	去皮去籽切粒
葵花籽油	20 克（約 4.4 茶匙）	熄火後拌入，份量必須準確

本批量煮成後約 3.6 公斤（能量約 4,149 千卡）。

製作步驟

1. 白米放入大湯鍋，加水蓋過，大火煮滾後轉中火煮 12 分鐘。
2. 加入鱸魚（起肉），中火煮 10 至 12 分鐘至完全熟透。全程用水煮，切勿用油煎。
3. 加入南瓜再煮 5 分鐘至軟身。
4. 拌入葵花籽油。份量請用量匙準確量度 - 這是配方唯一的油脂來源，多一點都會推高脂肪比例。
5. 連湯汁一起攤凍，按配量表分裝：3 日份量冷藏，其餘冷凍。

營養分析 (每 1000 千卡，未計補充品)

項目	每 1000 千卡	參考
脂肪	14 克	本組上限 18 克 (一般成犬糧約 40 至 60)
粗蛋白質	89 克	AAFCO 最低 45 克
碳水化合物	121 克	-
膳食纖維	3.1 克	低渣易消化
亞麻油酸 (必需脂肪酸)	3.5 克	AAFCO 最低 3.3 克
鈣 / 磷	1,250 / 1,022 毫克	鈣磷比 1.22:1


加入 蛋殼鈣粉 (每 1000 千卡約 3.0 克) 及 狗狗全方位保健粉 (每 1000 千卡約 10.4 克) 後，本配方已達到 AAFCO 成犬維持期營養標準的所有最低要求，可以長期作為主糧。這一點與腎病餐單不同：胰臟炎只需要控制脂肪，其他營養素完全不需要妥協。配方中的葵花籽油份量經過計算，用以達到必需脂肪酸 (亞麻油酸) 的最低要求，請勿省略。

餵飼及補充品配量表 (每日兩餐)

體重	每日能量需求	每日食量	本批可供	全方位保健粉 (每餐)	蛋殼鈣粉 (每餐)
3 公斤	251 千卡	約 220 克	約 17 日	1.3 克	0.4 克 (約 1/8 茶匙)
5 公斤	368 千卡	約 320 克	約 11 日	1.9 克	0.6 克 (約 1/4 茶匙)
10 公斤	619 千卡	約 540 克	約 7 日	3.2 克	0.9 克 (約 3/8 茶匙)
20 公斤	1,040 千卡	約 910 克	約 4 日	5.4 克	1.6 克 (約 5/8 茶匙)
30 公斤	1,410 千卡	約 1,230 克	約 3 日	7.4 克	2.1 克 (約 7/8 茶匙)

注意事項

- 脂肪是胰臟炎飲食的關鍵。切勿另加任何油 (配方指定的葵花籽油除外)、牛油、肥肉、雞皮、動物內臟、芝士或奶類製品 - 一次意外的高脂餐就足以觸發復發。
- 建議少量多餐：每日分 3 至 4 餐，比一日兩餐更能減輕胰臟負擔。下表以每日兩餐計算，如分四餐請把每餐份量減半。
- 急性發作期必須即時求診 (嘔吐、腹痛、弓背、不肯進食)。本書配方為康復期及長期管理而設，不適用於急性期。
- 迷你雪納瑞、貴婦犬等容易有高血脂的品種，長期維持低脂飲食特別重要。
- 轉換餐單以 7 日漸進過渡，期間留意嘔吐、腹瀉、食慾及精神狀態。
- 建議定期覆檢胰特異性脂肪酶 (cPLI) 及三酸甘油脂，並按獸醫指示調整脂肪水平。
- 本配方為體重正常的成犬而設；同時有其他疾病 (如腎病、糖尿病) 的狗狗，請先諮詢獸醫。



康復期・超低脂 06 / 20

鹿肉番薯餐（胰臟炎康復期）

同時有胰臟炎和食物敏感的狗狗最難處理：低敏配方通常用羊肉或三文魚，兩樣都太肥。鹿肉是少數又瘦又低敏的選擇，每 100 克只有 3.2 克脂肪。

本配方屬康復期（極低脂）組別。脂肪嚴格控制在每 1000 千卡 18 克 - 一般成犬糧約 40 至 60 克，即是說本配方大約只有三分之一。脂肪是引發胰臟炎的主要飲食因素，控制脂肪是整個餐單的核心。蛋白質為 139 克，以低脂高生物價來源為主；碳水化合物選用高消化率的番薯，膳食纖維只有 9.9 克，屬低渣設計，減輕消化負擔。

材料（標準批量）

食材	份量	處理
鹿肉	1.5 公斤	切粒
番薯	800 克	去皮切粒
南瓜	600 克	去皮去籽切粒
蛋白	200 克（約 6 隻蛋的蛋白）	只用蛋白，蛋黃脂肪高不可使用
葵花籽油	10 克（約 2.2 茶匙）	熄火後拌入，份量必須準確

本批量煮成後約 2.6 公斤（能量約 2,543 千卡）。

製作步驟

1. 番薯放入大湯鍋，加水蓋過，大火煮滾後轉中火煮 12 分鐘。
2. 加入鹿肉，中火煮 10 至 12 分鐘至完全熟透。全程用水煮，切勿用油煎。
3. 加入南瓜再煮 5 分鐘至軟身。
4. 蛋白打散，熄火後徐徐倒入並不斷攪拌，利用餘溫令蛋白凝固成絮狀。
5. 拌入葵花籽油。份量請用量匙準確量度 - 這是配方唯一的油脂來源，多一點都會推高脂肪比例。
6. 連湯汁一起攤凍，按配量表分裝：3 日份量冷藏，其餘冷凍。

營養分析 (每 1000 千卡，未計補充品)

項目	每 1000 千卡	參考
脂肪	18 克	本組上限 18 克 (一般成犬糧約 40 至 60)
粗蛋白質	139 克	AAFCO 最低 45 克
碳水化合物	65 克	-
膳食纖維	9.9 克	低渣易消化
亞麻油酸 (必需脂肪酸)	4.4 克	AAFCO 最低 3.3 克
鈣 / 磷	1,329 / 1,108 毫克	鈣磷比 1.20:1

加入 蛋殼鈣粉 (每 1000 千卡約 3.1 克) 及 狗狗全方位保健粉 (每 1000 千卡約 12.8 克) 後，本配方已達到 AAFCO 成犬維持期營養標準的所有最低要求，可以長期作為主糧。這一點與腎病餐單不同：胰臟炎只需要控制脂肪，其他營養素完全不需要妥協。配方中的葵花籽油份量經過計算，用以達到必需脂肪酸 (亞麻油酸) 的最低要求，請勿省略。

餵飼及補充品配量表 (每日兩餐)

體重	每日能量需求	每日食量	本批可供	全方位保健粉 (每餐)	蛋殼鈣粉 (每餐)
3 公斤	251 千卡	約 260 克	約 10 日	1.6 克	0.4 克 (約 1/8 茶匙)
5 公斤	368 千卡	約 370 克	約 7 日	2.4 克	0.6 克 (約 1/4 茶匙)
10 公斤	619 千卡	約 630 克	約 4 日	4.0 克	1.0 克 (約 3/8 茶匙)
20 公斤	1,040 千卡	約 1,060 克	約 2 日	6.6 克	1.6 克 (約 5/8 茶匙)
30 公斤	1,410 千卡	約 1,440 克	約 2 日	9.0 克	2.2 克 (約 7/8 茶匙)

注意事項

- 脂肪是胰臟炎飲食的關鍵。切勿另加任何油 (配方指定的葵花籽油除外)、牛油、肥肉、雞皮、動物內臟、芝士或奶類製品 - 一次意外的高脂餐就足以觸發復發。
- 建議少量多餐：每日分 3 至 4 餐，比一日兩餐更能減輕胰臟負擔。下表以每日兩餐計算，如分四餐請把每餐份量減半。
- 急性發作期必須即時求診 (嘔吐、腹痛、弓背、不肯進食)。本書配方為康復期及長期管理而設，不適用於急性期。
- 迷你雪納瑞、貴婦犬等容易有高血脂的品種，長期維持低脂飲食特別重要。
- 轉換餐單以 7 日漸進過渡，期間留意嘔吐、腹瀉、食慾及精神狀態。
- 建議定期覆檢胰特異性脂肪酶 (cPLI) 及三酸甘油脂，並按獸醫指示調整脂肪水平。
- 本配方為體重正常的成犬而設；同時有其他疾病 (如腎病、糖尿病) 的狗狗，請先諮詢獸醫。



康復期・超低脂 07 / 20

豬柳白飯餐（胰臟炎康復期）

很多主人一聽「胰臟炎」就把豬肉整個劃走，其實要劃走的是肥豬肉。豬柳（豬里脊）是全豬最瘦的部位，脂肪跟雞胸相若，街市隨時買到。

本配方屬康復期（極低脂）組別。脂肪嚴格控制在每 1000 千卡 15 克 - 一般成犬糧約 40 至 60 克，即是說本配方大約只有三分之一。脂肪是引發胰臟炎的主要飲食因素，控制脂肪是整個餐單的核心。蛋白質為 96 克，以低脂高生物價來源為主；碳水化合物選用高消化率的白米，膳食纖維只有 4.2 克，屬低渣設計，減輕消化負擔。

材料（標準批量）

食材	份量	處理
豬柳（豬里脊）	1.95 公斤	切粒，切除所有可見脂肪
白米	600 克	洗淨
四季豆	400 克	切段
蛋白	200 克（約 6 隻蛋的蛋白）	只用蛋白，蛋黃脂肪高不可使用
葵花籽油	15 克（約 3.3 茶匙）	熄火後拌入，份量必須準確

本批量煮成後約 3.6 公斤（能量約 4,506 千卡）。

製作步驟

1. 白米放入大湯鍋，加水蓋過，大火煮滾後轉中火煮 12 分鐘。
2. 加入豬柳（豬里脊），中火煮 10 至 12 分鐘至完全熟透。全程用水煮，切勿用油煎。
3. 加入四季豆再煮 5 分鐘至軟身。
4. 蛋白打散，熄火後徐徐倒入並不斷攪拌，利用餘溫令蛋白凝固成絮狀。
5. 拌入葵花籽油。份量請用量匙準確量度 - 這是配方唯一的油脂來源，多一點都會推高脂肪比例。
6. 連湯汁一起攤凍，按配量表分裝：3 日份量冷藏，其餘冷凍。

營養分析 (每 1000 千卡，未計補充品)

項目	每 1000 千卡	參考
脂肪	15 克	本組上限 18 克 (一般成犬糧約 40 至 60)
粗蛋白質	96 克	AAFCO 最低 45 克
碳水化合物	112 克	-
膳食纖維	4.2 克	低渣易消化
亞麻油酸 (必需脂肪酸)	3.7 克	AAFCO 最低 3.3 克
鈣 / 磷	1,250 / 1,000 毫克	鈣磷比 1.25:1

加入 蛋殼鈣粉 (每 1000 千卡約 3.0 克) 及 狗狗全方位保健粉 (每 1000 千卡約 7.9 克) 後，本配方已達到 AAFCO 成犬維持期營養標準的所有最低要求，可以長期作為主糧。這一點與腎病餐單不同：胰臟炎只需要控制脂肪，其他營養素完全不需要妥協。配方中的葵花籽油份量經過計算，用以達到必需脂肪酸 (亞麻油酸) 的最低要求，請勿省略。

餵飼及補充品配量表 (每日兩餐)

體重	每日能量需求	每日食量	本批可供	全方位保健粉 (每餐)	蛋殼鈣粉 (每餐)
3 公斤	251 千卡	約 200 克	約 18 日	1.0 克	0.4 克 (約 1/8 茶匙)
5 公斤	368 千卡	約 300 克	約 12 日	1.5 克	0.6 克 (約 1/4 茶匙)
10 公斤	619 千卡	約 500 克	約 7 日	2.4 克	0.9 克 (約 3/8 茶匙)
20 公斤	1,040 千卡	約 840 克	約 4 日	4.1 克	1.6 克 (約 5/8 茶匙)
30 公斤	1,410 千卡	約 1,140 克	約 3 日	5.6 克	2.1 克 (約 7/8 茶匙)

注意事項

- 脂肪是胰臟炎飲食的關鍵。切勿另加任何油 (配方指定的葵花籽油除外)、牛油、肥肉、雞皮、動物內臟、芝士或奶類製品 - 一次意外的高脂餐就足以觸發復發。
- 建議少量多餐：每日分 3 至 4 餐，比一日兩餐更能減輕胰臟負擔。下表以每日兩餐計算，如分四餐請把每餐份量減半。
- 急性發作期必須即時求診 (嘔吐、腹痛、弓背、不肯進食)。本書配方為康復期及長期管理而設，不適用於急性期。
- 迷你雪納瑞、貴婦犬等容易有高血脂的品種，長期維持低脂飲食特別重要。
- 轉換餐單以 7 日漸進過渡，期間留意嘔吐、腹瀉、食慾及精神狀態。
- 建議定期覆檢胰特異性脂肪酶 (cPLI) 及三酸甘油脂，並按獸醫指示調整脂肪水平。
- 本配方為體重正常的成犬而設；同時有其他疾病 (如腎病、糖尿病) 的狗狗，請先諮詢獸醫。



康復期・超低脂 08 / 20

雞胸蛋白薯仔餐（胰臟炎康復期）

蛋白是胰臟炎餐單裡的秘密武器：幾乎零脂肪（每 100 克只有 0.2 克），卻是生物價最高的蛋白質之一。用蛋白替代部分肉類，脂肪立刻再降一級。記住只用蛋白，蛋黃脂肪很高。

本配方屬康復期（極低脂）組別。脂肪嚴格控制在每 1000 千卡 15 克 - 一般成犬糧約 40 至 60 克，即是說本配方大約只有三分之一。脂肪是引發胰臟炎的主要飲食因素，控制脂肪是整個餐單的核心。蛋白質為 135 克，以低脂高生物價來源為主；碳水化合物選用高消化率的薯仔，膳食纖維只有 7.8 克，屬低渣設計，減輕消化負擔。

材料（標準批量）

食材	份量	處理
雞胸肉	1.8 公斤	切粒，去除所有可見脂肪
薯仔	1.2 公斤	去皮切粒
紅蘿蔔	200 克	切細粒
蛋白	400 克（約 12 隻蛋的蛋白）	只用蛋白，蛋黃脂肪高不可使用
葵花籽油	5 克（約 1.1 茶匙）	熄火後拌入，份量必須準確

本批量煮成後約 3.0 公斤（能量約 3,378 千卡）。

製作步驟

1. 薯仔放入大湯鍋，加水蓋過，大火煮滾後轉中火煮 12 分鐘。
2. 加入雞胸肉，中火煮 10 至 12 分鐘至完全熟透。全程用水煮，切勿用油煎。
3. 加入紅蘿蔔再煮 5 分鐘至軟身。
4. 蛋白打散，熄火後徐徐倒入並不斷攪拌，利用餘溫令蛋白凝固成絮狀。
5. 拌入葵花籽油。份量請用量匙準確量度 - 這是配方唯一的油脂來源，多一點都會推高脂肪比例。
6. 連湯汁一起攤凍，按配量表分裝：3 日份量冷藏，其餘冷凍。

營養分析 (每 1000 千卡，未計補充品)

項目	每 1000 千卡	參考
脂肪	15 克	本組上限 18 克 (一般成犬糧約 40 至 60)
粗蛋白質	135 克	AAFCO 最低 45 克
碳水化合物	73 克	-
膳食纖維	7.8 克	低渣易消化
亞麻油酸 (必需脂肪酸)	3.3 克	AAFCO 最低 3.3 克
鈣 / 磷	1,250 / 1,020 毫克	鈣磷比 1.23:1


加入 蛋殼鈣粉 (每 1000 千卡約 3.0 克) 及 狗狗全方位保健粉 (每 1000 千卡約 8.9 克) 後，本配方已達到 AAFCO 成犬維持期營養標準的所有最低要求，可以長期作為主糧。這一點與腎病餐單不同：胰臟炎只需要控制脂肪，其他營養素完全不需要妥協。配方中的葵花籽油份量經過計算，用以達到必需脂肪酸 (亞麻油酸) 的最低要求，請勿省略。

餵飼及補充品配量表 (每日兩餐)

體重	每日能量需求	每日食量	本批可供	全方位保健粉 (每餐)	蛋殼鈣粉 (每餐)
3 公斤	251 千卡	約 220 克	約 13 日	1.1 克	0.4 克 (約 1/8 茶匙)
5 公斤	368 千卡	約 330 克	約 9 日	1.6 克	0.6 克 (約 1/4 茶匙)
10 公斤	619 千卡	約 550 克	約 5 日	2.7 克	0.9 克 (約 3/8 茶匙)
20 公斤	1,040 千卡	約 920 克	約 3 日	4.6 克	1.6 克 (約 5/8 茶匙)
30 公斤	1,410 千卡	約 1,250 克	約 2 日	6.3 克	2.1 克 (約 7/8 茶匙)

注意事項

- 脂肪是胰臟炎飲食的關鍵。切勿另加任何油 (配方指定的葵花籽油除外)、牛油、肥肉、雞皮、動物內臟、芝士或奶類製品 - 一次意外的高脂餐就足以觸發復發。
- 建議少量多餐：每日分 3 至 4 餐，比一日兩餐更能減輕胰臟負擔。下表以每日兩餐計算，如分四餐請把每餐份量減半。
- 急性發作期必須即時求診 (嘔吐、腹痛、弓背、不肯進食)。本書配方為康復期及長期管理而設，不適用於急性期。
- 迷你雪納瑞、貴婦犬等容易有高血脂的品種，長期維持低脂飲食特別重要。
- 轉換餐單以 7 日漸進過渡，期間留意嘔吐、腹瀉、食慾及精神狀態。
- 建議定期覆檢胰特異性脂肪酶 (cPLI) 及三酸甘油脂，並按獸醫指示調整脂肪水平。
- 本配方為體重正常的成犬而設；同時有其他疾病 (如腎病、糖尿病) 的狗狗，請先諮詢獸醫。



康復期・超低脂 09 / 20

鱈魚蛋白番薯餐（胰臟炎康復期）

最瘦的魚配最瘦的蛋白質。這一款是為脂肪需要壓到最低的個案而設 - 例如反覆發作、或同時有高血脂的狗狗。請先與獸醫確認是否需要做到這個程度。

本配方屬康復期（極低脂）組別。脂肪嚴格控制在每 1000 千卡 18 克 - 一般成犬糧約 40 至 60 克，即是說本配方大約只有三分之一。脂肪是引發胰臟炎的主要飲食因素，控制脂肪是整個餐單的核心。蛋白質為 138 克，以低脂高生物價來源為主；碳水化合物選用高消化率的番薯，膳食纖維只有 9.2 克，屬低渣設計，減輕消化負擔。

材料（標準批量）

食材	份量	處理
鱈魚柳	2.1 公斤	可請魚檔代為起肉
番薯	1 公斤	去皮切粒
節瓜	200 克	去皮切粒
蛋白	800 克（約 24 隻蛋的蛋白）	只用蛋白，蛋黃脂肪高不可使用
葵花籽油	40 克（約 8.9 茶匙）	熄火後拌入，份量必須準確

本批量煮成後約 3.6 公斤（能量約 2,868 千卡）。

製作步驟

1. 番薯放入大湯鍋，加水蓋過，大火煮滾後轉中火煮 12 分鐘。
2. 加入鱈魚柳，中火煮 10 至 12 分鐘至完全熟透。全程用水煮，切勿用油煎。
3. 加入節瓜再煮 5 分鐘至軟身。
4. 蛋白打散，熄火後徐徐倒入並不斷攪拌，利用餘溫令蛋白凝固成絮狀。
5. 拌入葵花籽油。份量請用量匙準確量度 - 這是配方唯一的油脂來源，多一點都會推高脂肪比例。
6. 連湯汁一起攤凍，按配量表分裝：3 日份量冷藏，其餘冷凍。

營養分析 (每 1000 千卡，未計補充品)

項目	每 1000 千卡	參考
脂肪	18 克	本組上限 18 克 (一般成犬糧約 40 至 60)
粗蛋白質	138 克	AAFCO 最低 45 克
碳水化合物	64 克	-
膳食纖維	9.2 克	低渣易消化
亞麻油酸 (必需脂肪酸)	9.5 克	AAFCO 最低 3.3 克
鈣 / 磷	2,482 / 2,068 毫克	鈣磷比 1.20:1

加入 蛋殼鈣粉 (每 1000 千卡約 6.1 克) 及 狗狗全方位保健粉 (每 1000 千卡約 8.4 克) 後，本配方已達到 AAFCO 成犬維持期營養標準的所有最低要求，可以長期作為主糧。這一點與腎病餐單不同：胰臟炎只需要控制脂肪，其他營養素完全不需要妥協。配方中的葵花籽油份量經過計算，用以達到必需脂肪酸 (亞麻油酸) 的最低要求，請勿省略。

餵飼及補充品配量表 (每日兩餐)

體重	每日能量需求	每日食量	本批可供	全方位保健粉 (每餐)	蛋殼鈣粉 (每餐)
3 公斤	251 千卡	約 310 克	約 11 日	1.1 克	0.8 克 (約 1/4 茶匙)
5 公斤	368 千卡	約 460 克	約 8 日	1.6 克	1.1 克 (約 1/2 茶匙)
10 公斤	619 千卡	約 770 克	約 5 日	2.6 克	1.9 克 (約 3/4 茶匙)
20 公斤	1,040 千卡	約 1,290 克	約 3 日	4.4 克	3.2 克 (約 1 1/4 茶匙)
30 公斤	1,410 千卡	約 1,750 克	約 2 日	5.9 克	4.3 克 (約 1 3/4 茶匙)

注意事項

- 脂肪是胰臟炎飲食的關鍵。切勿另加任何油 (配方指定的葵花籽油除外)、牛油、肥肉、雞皮、動物內臟、芝士或奶類製品 - 一次意外的高脂餐就足以觸發復發。
- 建議少量多餐：每日分 3 至 4 餐，比一日兩餐更能減輕胰臟負擔。下表以每日兩餐計算，如分四餐請把每餐份量減半。
- 急性發作期必須即時求診 (嘔吐、腹痛、弓背、不肯進食)。本書配方為康復期及長期管理而設，不適用於急性期。
- 迷你雪納瑞、貴婦犬等容易有高血脂的品種，長期維持低脂飲食特別重要。
- 轉換餐單以 7 日漸進過渡，期間留意嘔吐、腹瀉、食慾及精神狀態。
- 建議定期覆檢胰特异性脂肪酶 (cPLI) 及三酸甘油脂，並按獸醫指示調整脂肪水平。
- 本配方為體重正常的成犬而設；同時有其他疾病 (如腎病、糖尿病) 的狗狗，請先諮詢獸醫。



康復期・超低脂 10 / 20

火雞蛋白薯仔餐（胰臟炎康復期）

火雞胸加蛋白，是康復期最穩陣的組合之一：脂肪低、蛋白質高、味道溫和不刺激。份量大，適合體型較大或食量較好的狗狗。

本配方屬康復期（極低脂）組別。脂肪嚴格控制在每 1000 千卡 14 克 - 一般成犬糧約 40 至 60 克，即是說本配方大約只有三分之一。脂肪是引發胰臟炎的主要飲食因素，控制脂肪是整個餐單的核心。蛋白質為 137 克，以低脂高生物價來源為主；碳水化合物選用高消化率的薯仔，膳食纖維只有 7.1 克，屬低渣設計，減輕消化負擔。

材料（標準批量）

食材	份量	處理
火雞胸肉	2.1 公斤	切粒，去皮
薯仔	1.4 公斤	去皮切粒
節瓜	200 克	去皮切粒
蛋白	400 克（約 12 隻蛋的蛋白）	只用蛋白，蛋黃脂肪高不可使用
葵花籽油	20 克（約 4.4 茶匙）	熄火後拌入，份量必須準確

本批量煮成後約 3.4 公斤（能量約 3,728 千卡）。

製作步驟

1. 薯仔放入大湯鍋，加水蓋過，大火煮滾後轉中火煮 12 分鐘。
2. 加入火雞胸肉，中火煮 10 至 12 分鐘至完全熟透。全程用水煮，切勿用油煎。
3. 加入節瓜再煮 5 分鐘至軟身。
4. 蛋白打散，熄火後徐徐倒入並不斷攪拌，利用餘溫令蛋白凝固成絮狀。
5. 拌入葵花籽油。份量請用量匙準確量度 - 這是配方唯一的油脂來源，多一點都會推高脂肪比例。
6. 連湯汁一起攤凍，按配量表分裝：3 日份量冷藏，其餘冷凍。

營養分析 (每 1000 千卡，未計補充品)

項目	每 1000 千卡	參考
脂肪	14 克	本組上限 18 克 (一般成犬糧約 40 至 60)
粗蛋白質	137 克	AAFCO 最低 45 克
碳水化合物	74 克	-
膳食纖維	7.1 克	低渣易消化
亞麻油酸 (必需脂肪酸)	5.4 克	AAFCO 最低 3.3 克
鈣 / 磷	1,303 / 1,086 毫克	鈣磷比 1.20:1

加入 蛋殼鈣粉 (每 1000 千卡約 3.2 克) 及 狗狗全方位保健粉 (每 1000 千卡約 7.1 克) 後，本配方已達到 AAFCO 成犬維持期營養標準的所有最低要求，可以長期作為主糧。這一點與腎病餐單不同：胰臟炎只需要控制脂肪，其他營養素完全不需要妥協。配方中的葵花籽油份量經過計算，用以達到必需脂肪酸 (亞麻油酸) 的最低要求，請勿省略。

餵飼及補充品配量表 (每日兩餐)

體重	每日能量需求	每日食量	本批可供	全方位保健粉 (每餐)	蛋殼鈣粉 (每餐)
3 公斤	251 千卡	約 230 克	約 15 日	0.9 克	0.4 克 (約 1/8 茶匙)
5 公斤	368 千卡	約 340 克	約 10 日	1.3 克	0.6 克 (約 1/4 茶匙)
10 公斤	619 千卡	約 570 克	約 6 日	2.2 克	1.0 克 (約 3/8 茶匙)
20 公斤	1,040 千卡	約 950 克	約 4 日	3.7 克	1.7 克 (約 5/8 茶匙)
30 公斤	1,410 千卡	約 1,290 克	約 3 日	5.0 克	2.3 克 (約 7/8 茶匙)

注意事項

- 脂肪是胰臟炎飲食的關鍵。切勿另加任何油 (配方指定的葵花籽油除外)、牛油、肥肉、雞皮、動物內臟、芝士或奶類製品 - 一次意外的高脂餐就足以觸發復發。
- 建議少量多餐：每日分 3 至 4 餐，比一日兩餐更能減輕胰臟負擔。下表以每日兩餐計算，如分四餐請把每餐份量減半。
- 急性發作期必須即時求診 (嘔吐、腹痛、弓背、不肯進食)。本書配方為康復期及長期管理而設，不適用於急性期。
- 迷你雪納瑞、貴婦犬等容易有高血脂的品種，長期維持低脂飲食特別重要。
- 轉換餐單以 7 日漸進過渡，期間留意嘔吐、腹瀉、食慾及精神狀態。
- 建議定期覆檢胰特異性脂肪酶 (cPLI) 及三酸甘油脂，並按獸醫指示調整脂肪水平。
- 本配方為體重正常的成犬而設；同時有其他疾病 (如腎病、糖尿病) 的狗狗，請先諮詢獸醫。

長期管理配方（低脂）



長期管理・低脂 11 / 20

雞胸肉番薯餐（低脂長期管理）

急性期過去之後，餐單可以稍為放鬆一點，但只是一點。長期管理組的脂肪維持在每 1000 千卡 18 至 24 克，比康復期寬鬆，仍然遠低於一般狗糧。這一款是日常主力。

本配方屬長期管理（低脂）組別。脂肪嚴格控制在每 1000 千卡 20 克 - 一般成犬糧約 40 至 60 克，即是說本配方大約只有三分之一。脂肪是引發胰臟炎的主要飲食因素，控制脂肪是整個餐單的核心。蛋白質為 139 克，以低脂高生物價來源為主；碳水化合物選用高消化率的番薯，膳食纖維只有 8.8 克，屬低渣設計，減輕消化負擔。

材料（標準批量）

食材	份量	處理
雞胸肉	2.1 公斤	切粒，去除所有可見脂肪
番薯	1 公斤	去皮切粒
南瓜	600 克	去皮去籽切粒
葵花籽油	15 克（約 3.3 茶匙）	熄火後拌入，份量必須準確

本批量煮成後約 3.0 公斤（能量約 3,394 千卡）。

製作步驟

1. 番薯放入大湯鍋，加水蓋過，大火煮滾後轉中火煮 12 分鐘。
2. 加入雞胸肉，中火煮 10 至 12 分鐘至完全熟透。全程用水煮，切勿用油煎。
3. 加入南瓜再煮 5 分鐘至軟身。
4. 拌入葵花籽油。份量請用量匙準確量度 - 這是配方唯一的油脂來源，多一點都會推高脂肪比例。
5. 連湯汁一起攤凍，按配量表分裝：3 日份量冷藏，其餘冷凍。

營養分析 (每 1000 千卡，未計補充品)

項目	每 1000 千卡	參考
脂肪	20 克	本組上限 25 克 (一般成犬糧約 40 至 60)
粗蛋白質	139 克	AAFCO 最低 45 克
碳水化合物	58 克	-
膳食纖維	8.8 克	低渣易消化
亞麻油酸 (必需脂肪酸)	5.6 克	AAFCO 最低 3.3 克
鈣 / 磷	1,353 / 1,127 毫克	鈣磷比 1.20:1


加入 蛋殼鈣粉 (每 1000 千卡約 3.1 克) 及 狗狗全方位保健粉 (每 1000 千卡約 8.6 克) 後，本配方已達到 AAFCO 成犬維持期營養標準的所有最低要求，可以長期作為主糧。這一點與腎病餐單不同：胰臟炎只需要控制脂肪，其他營養素完全不需要妥協。配方中的葵花籽油份量經過計算，用以達到必需脂肪酸 (亞麻油酸) 的最低要求，請勿省略。

餵飼及補充品配量表 (每日兩餐)

體重	每日能量需求	每日食量	本批可供	全方位保健粉 (每餐)	蛋殼鈣粉 (每餐)
3 公斤	251 千卡	約 220 克	約 14 日	1.1 克	0.4 克 (約 1/8 茶匙)
5 公斤	368 千卡	約 330 克	約 9 日	1.6 克	0.6 克 (約 1/4 茶匙)
10 公斤	619 千卡	約 550 克	約 5 日	2.7 克	1.0 克 (約 3/8 茶匙)
20 公斤	1,040 千卡	約 920 克	約 3 日	4.5 克	1.6 克 (約 5/8 茶匙)
30 公斤	1,410 千卡	約 1,250 克	約 2 日	6.1 克	2.2 克 (約 7/8 茶匙)

注意事項

- 脂肪是胰臟炎飲食的關鍵。切勿另加任何油 (配方指定的葵花籽油除外)、牛油、肥肉、雞皮、動物內臟、芝士或奶類製品 - 一次意外的高脂餐就足以觸發復發。
- 建議少量多餐：每日分 3 至 4 餐，比一日兩餐更能減輕胰臟負擔。下表以每日兩餐計算，如分四餐請把每餐份量減半。
- 急性發作期必須即時求診 (嘔吐、腹痛、弓背、不肯進食)。本書配方為康復期及長期管理而設，不適用於急性期。
- 迷你雪納瑞、貴婦犬等容易有高血脂的品種，長期維持低脂飲食特別重要。
- 轉換餐單以 7 日漸進過渡，期間留意嘔吐、腹瀉、食慾及精神狀態。
- 建議定期覆檢胰特異性脂肪酶 (cPLI) 及三酸甘油脂，並按獸醫指示調整脂肪水平。
- 本配方為體重正常的成犬而設；同時有其他疾病 (如腎病、糖尿病) 的狗狗，請先諮詢獸醫。



長期管理・低脂 12 / 20

火雞胸薯仔餐（低脂長期管理）

火雞胸配薯仔，是最不容易出錯的長期配方：材料簡單、脂肪穩定、大部分狗狗都肯吃。長期餵養最重要的不是完美，而是你真的煮得出來、狗狗真的吃得下。

本配方屬長期管理（低脂）組別。脂肪嚴格控制在每 1000 千卡 20 克 - 一般成犬糧約 40 至 60 克，即是說本配方大約只有三分之一。脂肪是引發胰臟炎的主要飲食因素，控制脂肪是整個餐單的核心。蛋白質為 139 克，以低脂高生物價來源為主；碳水化合物選用高消化率的薯仔，膳食纖維只有 6.7 克，屬低渣設計，減輕消化負擔。

材料（標準批量）

食材	份量	處理
火雞胸肉	1.8 公斤	切粒，去皮
薯仔	800 克	去皮切粒
節瓜	400 克	去皮切粒
葵花籽油	30 克（約 6.7 茶匙）	熄火後拌入，份量必須準確

本批量煮成後約 2.4 公斤（能量約 2,847 千卡）。

製作步驟

1. 薯仔放入大湯鍋，加水蓋過，大火煮滾後轉中火煮 12 分鐘。
2. 加入火雞胸肉，中火煮 10 至 12 分鐘至完全熟透。全程用水煮，切勿用油煎。
3. 加入節瓜再煮 5 分鐘至軟身。
4. 拌入葵花籽油。份量請用量匙準確量度 - 這是配方唯一的油脂來源，多一點都會推高脂肪比例。
5. 連湯汁一起攤凍，按配量表分裝：3 日份量冷藏，其餘冷凍。

營養分析 (每 1000 千卡，未計補充品)

項目	每 1000 千卡	參考
脂肪	20 克	本組上限 25 克 (一般成犬糧約 40 至 60)
粗蛋白質	139 克	AAFCO 最低 45 克
碳水化合物	59 克	-
膳食纖維	6.7 克	低渣易消化
亞麻油酸 (必需脂肪酸)	9.0 克	AAFCO 最低 3.3 克
鈣 / 磷	1,412 / 1,177 毫克	鈣磷比 1.20:1

加入 蛋殼鈣粉 (每 1000 千卡約 3.5 克) 及 狗狗全方位保健粉 (每 1000 千卡約 6.7 克) 後，本配方已達到 AAFCO 成犬維持期營養標準的所有最低要求，可以長期作為主糧。這一點與腎病餐單不同：胰臟炎只需要控制脂肪，其他營養素完全不需要妥協。配方中的葵花籽油份量經過計算，用以達到必需脂肪酸 (亞麻油酸) 的最低要求，請勿省略。

餵飼及補充品配量表 (每日兩餐)

體重	每日能量需求	每日食量	本批可供	全方位保健粉 (每餐)	蛋殼鈣粉 (每餐)
3 公斤	251 千卡	約 210 克	約 11 日	0.8 克	0.4 克 (約 1/8 茶匙)
5 公斤	368 千卡	約 310 克	約 8 日	1.2 克	0.6 克 (約 1/4 茶匙)
10 公斤	619 千卡	約 530 克	約 5 日	2.1 克	1.1 克 (約 3/8 茶匙)
20 公斤	1,040 千卡	約 890 克	約 3 日	3.5 克	1.8 克 (約 3/4 茶匙)
30 公斤	1,410 千卡	約 1,200 克	約 2 日	4.7 克	2.4 克 (約 1 茶匙)

注意事項

- 脂肪是胰臟炎飲食的關鍵。切勿另加任何油 (配方指定的葵花籽油除外)、牛油、肥肉、雞皮、動物內臟、芝士或奶類製品 - 一次意外的高脂餐就足以觸發復發。
- 建議少量多餐：每日分 3 至 4 餐，比一日兩餐更能減輕胰臟負擔。下表以每日兩餐計算，如分四餐請把每餐份量減半。
- 急性發作期必須即時求診 (嘔吐、腹痛、弓背、不肯進食)。本書配方為康復期及長期管理而設，不適用於急性期。
- 迷你雪納瑞、貴婦犬等容易有高血脂的品種，長期維持低脂飲食特別重要。
- 轉換餐單以 7 日漸進過渡，期間留意嘔吐、腹瀉、食慾及精神狀態。
- 建議定期覆檢胰特異性脂肪酶 (cPLI) 及三酸甘油脂，並按獸醫指示調整脂肪水平。
- 本配方為體重正常的成犬而設；同時有其他疾病 (如腎病、糖尿病) 的狗狗，請先諮詢獸醫。



長期管理・低脂 13 / 20

鱈魚白飯餐（低脂長期管理）

這一款蛋白質是全書最低（每 1000 千卡 73 克），碳水化合物比例最高，最接近傳統低脂腸胃處方糧的結構。適合消化能力較弱、或同時有腸胃問題的狗狗。

本配方屬長期管理（低脂）組別。脂肪嚴格控制在每 1000 千卡 18 克 - 一般成犬糧約 40 至 60 克，即是說本配方大約只有三分之一。脂肪是引發胰臟炎的主要飲食因素，控制脂肪是整個餐單的核心。蛋白質為 73 克，以低脂高生物價來源為主；碳水化合物選用高消化率的白米，膳食纖維只有 7.8 克，屬低渣設計，減輕消化負擔。

材料（標準批量）

食材	份量	處理
鱈魚柳	1.2 公斤	可請魚檔代為起肉
白米	400 克	洗淨
紅蘿蔔	600 克	切細粒
葵花籽油	40 克（約 8.9 茶匙）	熄火後拌入，份量必須準確

本批量煮成後約 2.6 公斤（能量約 2,774 千卡）。

製作步驟

1. 白米放入大湯鍋，加水蓋過，大火煮滾後轉中火煮 12 分鐘。
2. 加入鱈魚柳，中火煮 10 至 12 分鐘至完全熟透。全程用水煮，切勿用油煎。
3. 加入紅蘿蔔再煮 5 分鐘至軟身。
4. 拌入葵花籽油。份量請用量匙準確量度 - 這是配方唯一的油脂來源，多一點都會推高脂肪比例。
5. 連湯汁一起攤凍，按配量表分裝：3 日份量冷藏，其餘冷凍。

營養分析 (每 1000 千卡，未計補充品)

項目	每 1000 千卡	參考
脂肪	18 克	本組上限 25 克 (一般成犬糧約 40 至 60)
粗蛋白質	73 克	AAFCO 最低 45 克
碳水化合物	131 克	-
膳食纖維	7.8 克	低渣易消化
亞麻油酸 (必需脂肪酸)	10.0 克	AAFCO 最低 3.3 克
鈣 / 磷	1,625 / 1,355 毫克	鈣磷比 1.20:1


加入 蛋殼鈣粉 (每 1000 千卡約 3.9 克) 及 狗狗全方位保健粉 (每 1000 千卡約 9.6 克) 後，本配方已達到 AAFCO 成犬維持期營養標準的所有最低要求，可以長期作為主糧。這一點與腎病餐單不同：胰臟炎只需要控制脂肪，其他營養素完全不需要妥協。配方中的葵花籽油份量經過計算，用以達到必需脂肪酸 (亞麻油酸) 的最低要求，請勿省略。

餵飼及補充品配量表 (每日兩餐)

體重	每日能量需求	每日食量	本批可供	全方位保健粉 (每餐)	蛋殼鈣粉 (每餐)
3 公斤	251 千卡	約 240 克	約 11 日	1.2 克	0.5 克 (約 1/4 茶匙)
5 公斤	368 千卡	約 350 克	約 8 日	1.8 克	0.7 克 (約 1/4 茶匙)
10 公斤	619 千卡	約 590 克	約 4 日	3.0 克	1.2 克 (約 1/2 茶匙)
20 公斤	1,040 千卡	約 990 克	約 3 日	5.0 克	2.0 克 (約 7/8 茶匙)
30 公斤	1,410 千卡	約 1,340 克	約 2 日	6.8 克	2.8 克 (約 1 1/8 茶匙)

注意事項

- 脂肪是胰臟炎飲食的關鍵。切勿另加任何油 (配方指定的葵花籽油除外)、牛油、肥肉、雞皮、動物內臟、芝士或奶類製品 - 一次意外的高脂餐就足以觸發復發。
- 建議少量多餐：每日分 3 至 4 餐，比一日兩餐更能減輕胰臟負擔。下表以每日兩餐計算，如分四餐請把每餐份量減半。
- 急性發作期必須即時求診 (嘔吐、腹痛、弓背、不肯進食)。本書配方為康復期及長期管理而設，不適用於急性期。
- 迷你雪納瑞、貴婦犬等容易有高血脂的品種，長期維持低脂飲食特別重要。
- 轉換餐單以 7 日漸進過渡，期間留意嘔吐、腹瀉、食慾及精神狀態。
- 建議定期覆檢胰特异性脂肪酶 (cPLI) 及三酸甘油脂，並按獸醫指示調整脂肪水平。
- 本配方為體重正常的成犬而設；同時有其他疾病 (如腎病、糖尿病) 的狗狗，請先諮詢獸醫。



長期管理・低脂 14 / 20

狹鱈薯仔餐（低脂長期管理）

長期低脂餵養，成本是能不能撐下去的關鍵。狹鱈是全書性價比最高的蛋白質，這一款也是纖維較高的一個，對容易便秘的狗狗有幫助。

本配方屬長期管理（低脂）組別。脂肪嚴格控制在每 1000 千卡 20 克 - 一般成犬糧約 40 至 60 克，即是說本配方大約只有三分之一。脂肪是引發胰臟炎的主要飲食因素，控制脂肪是整個餐單的核心。蛋白質為 127 克，以低脂高生物價來源為主；碳水化合物選用高消化率的薯仔，膳食纖維只有 11.3 克，屬低渣設計，減輕消化負擔。

材料（標準批量）

食材	份量	處理
狹鱈柳（明太魚）	2.1 公斤	解凍後切件
薯仔	1 公斤	去皮切粒
四季豆	600 克	切段
葵花籽油	40 克（約 8.9 茶匙）	熄火後拌入，份量必須準確

本批量煮成後約 3.1 公斤（能量約 3,118 千卡）。

製作步驟

1. 薯仔放入大湯鍋，加水蓋過，大火煮滾後轉中火煮 12 分鐘。
2. 加入狹鱈柳（明太魚），中火煮 10 至 12 分鐘至完全熟透。全程用水煮，切勿用油煎。
3. 加入四季豆再煮 5 分鐘至軟身。
4. 拌入葵花籽油。份量請用量匙準確量度 - 這是配方唯一的油脂來源，多一點都會推高脂肪比例。
5. 連湯汁一起攤凍，按配量表分裝：3 日份量冷藏，其餘冷凍。

營養分析 (每 1000 千卡，未計補充品)

項目	每 1000 千卡	參考
脂肪	20 克	本組上限 25 克 (一般成犬糧約 40 至 60)
粗蛋白質	127 克	AAFCO 最低 45 克
碳水化合物	75 克	-
膳食纖維	11.3 克	低渣易消化
亞麻油酸 (必需脂肪酸)	8.7 克	AAFCO 最低 3.3 克
鈣 / 磷	1,828 / 1,523 毫克	鈣磷比 1.20:1

加入 蛋殼鈣粉 (每 1000 千卡約 3.6 克) 及 狗狗全方位保健粉 (每 1000 千卡約 7.9 克) 後，本配方已達到 AAFCO 成犬維持期營養標準的所有最低要求，可以長期作為主糧。這一點與腎病餐單不同：胰臟炎只需要控制脂肪，其他營養素完全不需要妥協。配方中的葵花籽油份量經過計算，用以達到必需脂肪酸 (亞麻油酸) 的最低要求，請勿省略。

餵飼及補充品配量表 (每日兩餐)

體重	每日能量需求	每日食量	本批可供	全方位保健粉 (每餐)	蛋殼鈣粉 (每餐)
3 公斤	251 千卡	約 250 克	約 12 日	1.0 克	0.5 克 (約 1/8 茶匙)
5 公斤	368 千卡	約 370 克	約 8 日	1.5 克	0.7 克 (約 1/4 茶匙)
10 公斤	619 千卡	約 620 克	約 5 日	2.5 克	1.1 克 (約 1/2 茶匙)
20 公斤	1,040 千卡	約 1,050 克	約 3 日	4.1 克	1.9 克 (約 3/4 茶匙)
30 公斤	1,410 千卡	約 1,420 克	約 2 日	5.6 克	2.5 克 (約 1 茶匙)

注意事項

- 脂肪是胰臟炎飲食的關鍵。切勿另加任何油 (配方指定的葵花籽油除外)、牛油、肥肉、雞皮、動物內臟、芝士或奶類製品 - 一次意外的高脂餐就足以觸發復發。
- 建議少量多餐：每日分 3 至 4 餐，比一日兩餐更能減輕胰臟負擔。下表以每日兩餐計算，如分四餐請把每餐份量減半。
- 急性發作期必須即時求診 (嘔吐、腹痛、弓背、不肯進食)。本書配方為康復期及長期管理而設，不適用於急性期。
- 迷你雪納瑞、貴婦犬等容易有高血脂的品種，長期維持低脂飲食特別重要。
- 轉換餐單以 7 日漸進過渡，期間留意嘔吐、腹瀉、食慾及精神狀態。
- 建議定期覆檢胰特异性脂肪酶 (cPLI) 及三酸甘油脂，並按獸醫指示調整脂肪水平。
- 本配方為體重正常的成犬而設；同時有其他疾病 (如腎病、糖尿病) 的狗狗，請先諮詢獸醫。



長期管理・低脂 15 / 20

鱸魚白飯餐（低脂長期管理）

纖維最低的一款（每 1000 千卡只有 2.6

克），質地最溫和。剛由康復期過渡到長期餐單，腸胃仍然敏感的狗狗，可以由這一款開始。

本配方屬長期管理（低脂）組別。脂肪嚴格控制在每 1000 千卡 20 克 - 一般成犬糧約 40 至 60 克，即是說本配方大約只有三分之一。脂肪是引發胰臟炎的主要飲食因素，控制脂肪是整個餐單的核心。蛋白質為 98 克，以低脂高生物價來源為主；碳水化合物選用高消化率的白米，膳食纖維只有 2.6 克，屬低渣設計，減輕消化負擔。

材料（標準批量）

食材	份量	處理
鱸魚（起肉）	1.65 公斤	可請魚檔代為起肉
白米	400 克	洗淨
南瓜	400 克	去皮去籽切粒
葵花籽油	30 克（約 6.7 茶匙）	熄火後拌入，份量必須準確

本批量煮成後約 2.8 公斤（能量約 3,332 千卡）。

製作步驟

1. 白米放入大湯鍋，加水蓋過，大火煮滾後轉中火煮 12 分鐘。
2. 加入鱸魚（起肉），中火煮 10 至 12 分鐘至完全熟透。全程用水煮，切勿用油煎。
3. 加入南瓜再煮 5 分鐘至軟身。
4. 拌入葵花籽油。份量請用量匙準確量度 - 這是配方唯一的油脂來源，多一點都會推高脂肪比例。
5. 連湯汁一起攤凍，按配量表分裝：3 日份量冷藏，其餘冷凍。

營養分析 (每 1000 千卡，未計補充品)

項目	每 1000 千卡	參考
脂肪	20 克	本組上限 25 克 (一般成犬糧約 40 至 60)
粗蛋白質	98 克	AAFCO 最低 45 克
碳水化合物	100 克	-
膳食纖維	2.6 克	低渣易消化
亞麻油酸 (必需脂肪酸)	6.2 克	AAFCO 最低 3.3 克
鈣 / 磷	1,320 / 1,100 毫克	鈣磷比 1.20:1


加入 蛋殼鈣粉 (每 1000 千卡約 3.2 克) 及 狗狗全方位保健粉 (每 1000 千卡約 10.4 克) 後，本配方已達到 AAFCO 成犬維持期營養標準的所有最低要求，可以長期作為主糧。這一點與腎病餐單不同：胰臟炎只需要控制脂肪，其他營養素完全不需要妥協。配方中的葵花籽油份量經過計算，用以達到必需脂肪酸 (亞麻油酸) 的最低要求，請勿省略。

餵飼及補充品配量表 (每日兩餐)

體重	每日能量需求	每日食量	本批可供	全方位保健粉 (每餐)	蛋殼鈣粉 (每餐)
3 公斤	251 千卡	約 210 克	約 13 日	1.3 克	0.4 克 (約 1/8 茶匙)
5 公斤	368 千卡	約 310 克	約 9 日	1.9 克	0.6 克 (約 1/4 茶匙)
10 公斤	619 千卡	約 510 克	約 5 日	3.2 克	1.0 克 (約 3/8 茶匙)
20 公斤	1,040 千卡	約 860 克	約 3 日	5.4 克	1.7 克 (約 5/8 茶匙)
30 公斤	1,410 千卡	約 1,170 克	約 2 日	7.4 克	2.3 克 (約 7/8 茶匙)

注意事項

- 脂肪是胰臟炎飲食的關鍵。切勿另加任何油 (配方指定的葵花籽油除外)、牛油、肥肉、雞皮、動物內臟、芝士或奶類製品 - 一次意外的高脂餐就足以觸發復發。
- 建議少量多餐：每日分 3 至 4 餐，比一日兩餐更能減輕胰臟負擔。下表以每日兩餐計算，如分四餐請把每餐份量減半。
- 急性發作期必須即時求診 (嘔吐、腹痛、弓背、不肯進食)。本書配方為康復期及長期管理而設，不適用於急性期。
- 迷你雪納瑞、貴婦犬等容易有高血脂的品種，長期維持低脂飲食特別重要。
- 轉換餐單以 7 日漸進過渡，期間留意嘔吐、腹瀉、食慾及精神狀態。
- 建議定期覆檢胰特異性脂肪酶 (cPLI) 及三酸甘油脂，並按獸醫指示調整脂肪水平。
- 本配方為體重正常的成犬而設；同時有其他疾病 (如腎病、糖尿病) 的狗狗，請先諮詢獸醫。



長期管理・低脂 16 / 20

鹿肉番薯餐（低脂長期管理）

低敏加低脂的長期版本。纖維是全書最高（每 1000 千卡 12.4 克），對腸道菌群和糞便質素有幫助 - 胰臟炎狗狗的便便，往往是最先出問題的地方。

本配方屬長期管理（低脂）組別。脂肪嚴格控制在每 1000 千卡 20 克 - 一般成犬糧約 40 至 60 克，即是說本配方大約只有三分之一。脂肪是引發胰臟炎的主要飲食因素，控制脂肪是整個餐單的核心。蛋白質為 139 克，以低脂高生物價來源為主；碳水化合物選用高消化率的番薯，膳食纖維只有 12.4 克，屬低渣設計，減輕消化負擔。

材料（標準批量）

食材	份量	處理
鹿肉	1.5 公斤	切粒
番薯	600 克	去皮切粒
紅蘿蔔	600 克	切細粒
蛋白	200 克（約 6 隻蛋的蛋白）	只用蛋白，蛋黃脂肪高不可使用
葵花籽油	15 克（約 3.3 茶匙）	熄火後拌入，份量必須準確

本批量煮成後約 2.4 公斤（能量約 2,528 千卡）。

製作步驟

1. 番薯放入大湯鍋，加水蓋過，大火煮滾後轉中火煮 12 分鐘。
2. 加入鹿肉，中火煮 10 至 12 分鐘至完全熟透。全程用水煮，切勿用油煎。
3. 加入紅蘿蔔再煮 5 分鐘至軟身。
4. 蛋白打散，熄火後徐徐倒入並不斷攪拌，利用餘溫令蛋白凝固成絮狀。
5. 拌入葵花籽油。份量請用量匙準確量度 - 這是配方唯一的油脂來源，多一點都會推高脂肪比例。
6. 連湯汁一起攤凍，按配量表分裝：3 日份量冷藏，其餘冷凍。

營養分析 (每 1000 千卡，未計補充品)

項目	每 1000 千卡	參考
脂肪	20 克	本組上限 25 克 (一般成犬糧約 40 至 60)
粗蛋白質	139 克	AAFCO 最低 45 克
碳水化合物	59 克	-
膳食纖維	12.4 克	低渣易消化
亞麻油酸 (必需脂肪酸)	5.9 克	AAFCO 最低 3.3 克
鈣 / 磷	1,308 / 1,090 毫克	鈣磷比 1.20:1

加入 蛋殼鈣粉 (每 1000 千卡約 3.0 克) 及 狗狗全方位保健粉 (每 1000 千卡約 10.4 克) 後，本配方已達到 AAFCO 成犬維持期營養標準的所有最低要求，可以長期作為主糧。這一點與腎病餐單不同：胰臟炎只需要控制脂肪，其他營養素完全不需要妥協。配方中的葵花籽油份量經過計算，用以達到必需脂肪酸 (亞麻油酸) 的最低要求，請勿省略。

餵飼及補充品配量表 (每日兩餐)

體重	每日能量需求	每日食量	本批可供	全方位保健粉 (每餐)	蛋殼鈣粉 (每餐)
3 公斤	251 千卡	約 240 克	約 10 日	1.3 克	0.4 克 (約 1/8 茶匙)
5 公斤	368 千卡	約 350 克	約 7 日	1.9 克	0.6 克 (約 1/4 茶匙)
10 公斤	619 千卡	約 590 克	約 4 日	3.2 克	0.9 克 (約 3/8 茶匙)
20 公斤	1,040 千卡	約 990 克	約 2 日	5.4 克	1.6 克 (約 5/8 茶匙)
30 公斤	1,410 千卡	約 1,340 克	約 2 日	7.4 克	2.1 克 (約 7/8 茶匙)

注意事項

- 脂肪是胰臟炎飲食的關鍵。切勿另加任何油 (配方指定的葵花籽油除外)、牛油、肥肉、雞皮、動物內臟、芝士或奶類製品 - 一次意外的高脂餐就足以觸發復發。
- 建議少量多餐：每日分 3 至 4 餐，比一日兩餐更能減輕胰臟負擔。下表以每日兩餐計算，如分四餐請把每餐份量減半。
- 急性發作期必須即時求診 (嘔吐、腹痛、弓背、不肯進食)。本書配方為康復期及長期管理而設，不適用於急性期。
- 迷你雪納瑞、貴婦犬等容易有高血脂的品種，長期維持低脂飲食特別重要。
- 轉換餐單以 7 日漸進過渡，期間留意嘔吐、腹瀉、食慾及精神狀態。
- 建議定期覆檢胰特異性脂肪酶 (cPLI) 及三酸甘油脂，並按獸醫指示調整脂肪水平。
- 本配方為體重正常的成犬而設；同時有其他疾病 (如腎病、糖尿病) 的狗狗，請先諮詢獸醫。



長期管理・低脂 17 / 20

豬柳薯仔餐（低脂長期管理）

這一款需要的保健粉份量是全書最低（每 1000 千卡 6.2 克）- 因為豬柳本身的維他命 B 群和礦物質相當豐富。長期餵養，補充品用量少一點，成本也實際一點。

本配方屬長期管理（低脂）組別。脂肪嚴格控制在每 1000 千卡 20 克 - 一般成犬糧約 40 至 60 克，即是說本配方大約只有三分之一。脂肪是引發胰臟炎的主要飲食因素，控制脂肪是整個餐單的核心。蛋白質為 140 克，以低脂高生物價來源為主；碳水化合物選用高消化率的薯仔，膳食纖維只有 6.6 克，屬低渣設計，減輕消化負擔。

材料（標準批量）

食材	份量	處理
豬柳（豬里脊）	2.1 公斤	切粒，切除所有可見脂肪
薯仔	800 克	去皮切粒
節瓜	400 克	去皮切粒
葵花籽油	5 克（約 1.1 茶匙）	熄火後拌入，份量必須準確

本批量煮成後約 2.6 公斤（能量約 2,876 千卡）。

製作步驟

1. 薯仔放入大湯鍋，加水蓋過，大火煮滾後轉中火煮 12 分鐘。
2. 加入豬柳（豬里脊），中火煮 10 至 12 分鐘至完全熟透。全程用水煮，切勿用油煎。
3. 加入節瓜再煮 5 分鐘至軟身。
4. 拌入葵花籽油。份量請用量匙準確量度 - 這是配方唯一的油脂來源，多一點都會推高脂肪比例。
5. 連湯汁一起攤凍，按配量表分裝：3 日份量冷藏，其餘冷凍。

營養分析 (每 1000 千卡，未計補充品)

項目	每 1000 千卡	參考
脂肪	20 克	本組上限 25 克 (一般成犬糧約 40 至 60)
粗蛋白質	140 克	AAFCO 最低 45 克
碳水化合物	59 克	-
膳食纖維	6.6 克	低渣易消化
亞麻油酸 (必需脂肪酸)	3.5 克	AAFCO 最低 3.3 克
鈣 / 磷	1,826 / 1,522 毫克	鈣磷比 1.20:1


加入 蛋殼鈣粉 (每 1000 千卡約 4.6 克) 及 狗狗全方位保健粉 (每 1000 千卡約 6.2 克) 後，本配方已達到 AAFCO 成犬維持期營養標準的所有最低要求，可以長期作為主糧。這一點與腎病餐單不同：胰臟炎只需要控制脂肪，其他營養素完全不需要妥協。配方中的葵花籽油份量經過計算，用以達到必需脂肪酸 (亞麻油酸) 的最低要求，請勿省略。

餵飼及補充品配量表 (每日兩餐)

體重	每日能量需求	每日食量	本批可供	全方位保健粉 (每餐)	蛋殼鈣粉 (每餐)
3 公斤	251 千卡	約 230 克	約 11 日	0.8 克	0.6 克 (約 1/4 茶匙)
5 公斤	368 千卡	約 330 克	約 8 日	1.1 克	0.8 克 (約 3/8 茶匙)
10 公斤	619 千卡	約 560 克	約 5 日	1.9 克	1.4 克 (約 5/8 茶匙)
20 公斤	1,040 千卡	約 950 克	約 3 日	3.2 克	2.4 克 (約 1 茶匙)
30 公斤	1,410 千卡	約 1,280 克	約 2 日	4.3 克	3.2 克 (約 1 1/4 茶匙)

注意事項

- 脂肪是胰臟炎飲食的關鍵。切勿另加任何油 (配方指定的葵花籽油除外)、牛油、肥肉、雞皮、動物內臟、芝士或奶類製品 - 一次意外的高脂餐就足以觸發復發。
- 建議少量多餐：每日分 3 至 4 餐，比一日兩餐更能減輕胰臟負擔。下表以每日兩餐計算，如分四餐請把每餐份量減半。
- 急性發作期必須即時求診 (嘔吐、腹痛、弓背、不肯進食)。本書配方為康復期及長期管理而設，不適用於急性期。
- 迷你雪納瑞、貴婦犬等容易有高血脂的品種，長期維持低脂飲食特別重要。
- 轉換餐單以 7 日漸進過渡，期間留意嘔吐、腹瀉、食慾及精神狀態。
- 建議定期覆檢胰特異性脂肪酶 (cPLI) 及三酸甘油脂，並按獸醫指示調整脂肪水平。
- 本配方為體重正常的成犬而設；同時有其他疾病 (如腎病、糖尿病) 的狗狗，請先諮詢獸醫。



長期管理・低脂 18 / 20

牛腩肉番薯餐（低脂長期管理）

胰臟炎狗狗可以吃牛肉嗎？可以 -

前提是選對部位。牛腩肉是全牛最瘦的部位之一，切除所有可見脂肪後，脂肪含量可以壓到每 1000 千卡 24 克。這是全書脂肪最高的一款，只適合長期管理、狀況穩定的狗狗。

本配方屬長期管理（低脂）組別。脂肪嚴格控制在每 1000 千卡 24 克 - 一般成犬糧約 40 至 60 克，即是說本配方大約只有三分之一。脂肪是引發胰臟炎的主要飲食因素，控制脂肪是整個餐單的核心。蛋白質為 140 克，以低脂高生物價來源為主；碳水化合物選用高消化率的番薯，膳食纖維只有 8.4 克，屬低渣設計，減輕消化負擔。

材料（標準批量）

食材	份量	處理
牛腩肉	2.1 公斤	切粒，切除所有可見脂肪
番薯	800 克	去皮切粒
節瓜	600 克	去皮切粒
葵花籽油	15 克（約 3.3 茶匙）	熄火後拌入，份量必須準確

本批量煮成後約 2.8 公斤（能量約 3,220 千卡）。

製作步驟

1. 番薯放入大湯鍋，加水蓋過，大火煮滾後轉中火煮 12 分鐘。
2. 加入牛腩肉，中火煮 10 至 12 分鐘至完全熟透。全程用水煮，切勿用油煎。
3. 加入節瓜再煮 5 分鐘至軟身。
4. 拌入葵花籽油。份量請用量匙準確量度 - 這是配方唯一的油脂來源，多一點都會推高脂肪比例。
5. 連湯汁一起攪凍，按配量表分裝：3 日份量冷藏，其餘冷凍。

營養分析 (每 1000 千卡，未計補充品)

項目	每 1000 千卡	參考
脂肪	24 克	本組上限 25 克 (一般成犬糧約 40 至 60)
粗蛋白質	140 克	AAFCO 最低 45 克
碳水化合物	49 克	-
膳食纖維	8.4 克	低渣易消化
亞麻油酸 (必需脂肪酸)	3.9 克	AAFCO 最低 3.3 克
鈣 / 磷	1,250 / 1,003 毫克	鈣磷比 1.25:1

加入 蛋殼鈣粉 (每 1000 千卡約 2.9 克) 及 狗狗全方位保健粉 (每 1000 千卡約 10.4 克) 後，本配方已達到 AAFCO 成犬維持期營養標準的所有最低要求，可以長期作為主糧。這一點與腎病餐單不同：胰臟炎只需要控制脂肪，其他營養素完全不需要妥協。配方中的葵花籽油份量經過計算，用以達到必需脂肪酸 (亞麻油酸) 的最低要求，請勿省略。

餵飼及補充品配量表 (每日兩餐)

體重	每日能量需求	每日食量	本批可供	全方位保健粉 (每餐)	蛋殼鈣粉 (每餐)
3 公斤	251 千卡	約 220 克	約 13 日	1.3 克	0.4 克 (約 1/8 茶匙)
5 公斤	368 千卡	約 320 克	約 9 日	1.9 克	0.5 克 (約 1/4 茶匙)
10 公斤	619 千卡	約 540 克	約 5 日	3.2 克	0.9 克 (約 3/8 茶匙)
20 公斤	1,040 千卡	約 910 克	約 3 日	5.4 克	1.5 克 (約 5/8 茶匙)
30 公斤	1,410 千卡	約 1,230 克	約 2 日	7.4 克	2.1 克 (約 7/8 茶匙)

注意事項

- 脂肪是胰臟炎飲食的關鍵。切勿另加任何油 (配方指定的葵花籽油除外)、牛油、肥肉、雞皮、動物內臟、芝士或奶類製品 - 一次意外的高脂餐就足以觸發復發。
- 建議少量多餐：每日分 3 至 4 餐，比一日兩餐更能減輕胰臟負擔。下表以每日兩餐計算，如分四餐請把每餐份量減半。
- 急性發作期必須即時求診 (嘔吐、腹痛、弓背、不肯進食)。本書配方為康復期及長期管理而設，不適用於急性期。
- 迷你雪納瑞、貴婦犬等容易有高血脂的品種，長期維持低脂飲食特別重要。
- 轉換餐單以 7 日漸進過渡，期間留意嘔吐、腹瀉、食慾及精神狀態。
- 建議定期覆檢胰特異性脂肪酶 (cPLI) 及三酸甘油脂，並按獸醫指示調整脂肪水平。
- 本配方為體重正常的成犬而設；同時有其他疾病 (如腎病、糖尿病) 的狗狗，請先諮詢獸醫。



長期管理・低脂 19 / 20

雞胸蛋白番薯餐（低脂長期管理）

用蛋白拉低脂肪、同時保住蛋白質，是長期低脂餵養最實用的一招。這一款份量大，適合中大型犬，一鍋可以煮足幾日。

本配方屬長期管理（低脂）組別。脂肪嚴格控制在每 1000 千卡 20 克 - 一般成犬糧約 40 至 60 克，即是說本配方大約只有三分之一。脂肪是引發胰臟炎的主要飲食因素，控制脂肪是整個餐單的核心。蛋白質為 139 克，以低脂高生物價來源為主；碳水化合物選用高消化率的番薯，膳食纖維只有 9.2 克，屬低渣設計，減輕消化負擔。

材料（標準批量）

食材	份量	處理
雞胸肉	2.1 公斤	切粒，去除所有可見脂肪
番薯	1.2 公斤	去皮切粒
四季豆	200 克	切段
蛋白	400 克（約 12 隻蛋的蛋白）	只用蛋白，蛋黃脂肪高不可使用
葵花籽油	20 克（約 4.4 茶匙）	熄火後拌入，份量必須準確

本批量煮成後約 3.2 公斤（能量約 3,743 千卡）。

製作步驟

1. 番薯放入大湯鍋，加水蓋過，大火煮滾後轉中火煮 12 分鐘。
2. 加入雞胸肉，中火煮 10 至 12 分鐘至完全熟透。全程用水煮，切勿用油煎。
3. 加入四季豆再煮 5 分鐘至軟身。
4. 蛋白打散，熄火後徐徐倒入並不斷攪拌，利用餘溫令蛋白凝固成絮狀。
5. 拌入葵花籽油。份量請用量匙準確量度 - 這是配方唯一的油脂來源，多一點都會推高脂肪比例。
6. 連湯汁一起攤凍，按配量表分裝：3 日份量冷藏，其餘冷凍。

營養分析 (每 1000 千卡，未計補充品)

項目	每 1000 千卡	參考
脂肪	20 克	本組上限 25 克 (一般成犬糧約 40 至 60)
粗蛋白質	139 克	AAFCO 最低 45 克
碳水化合物	59 克	-
膳食纖維	9.2 克	低渣易消化
亞麻油酸 (必需脂肪酸)	6.0 克	AAFCO 最低 3.3 克
鈣 / 磷	1,250 / 1,024 毫克	鈣磷比 1.22:1

加入 蛋殼鈣粉 (每 1000 千卡約 2.8 克) 及 狗狗全方位保健粉 (每 1000 千卡約 8.8 克) 後，本配方已達到 AAFCO 成犬維持期營養標準的所有最低要求，可以長期作為主糧。這一點與腎病餐單不同：胰臟炎只需要控制脂肪，其他營養素完全不需要妥協。配方中的葵花籽油份量經過計算，用以達到必需脂肪酸 (亞麻油酸) 的最低要求，請勿省略。

餵飼及補充品配量表 (每日兩餐)

體重	每日能量需求	每日食量	本批可供	全方位保健粉 (每餐)	蛋殼鈣粉 (每餐)
3 公斤	251 千卡	約 220 克	約 15 日	1.1 克	0.4 克 (約 1/8 茶匙)
5 公斤	368 千卡	約 320 克	約 10 日	1.6 克	0.5 克 (約 1/4 茶匙)
10 公斤	619 千卡	約 530 克	約 6 日	2.7 克	0.9 克 (約 3/8 茶匙)
20 公斤	1,040 千卡	約 890 克	約 4 日	4.6 克	1.5 克 (約 5/8 茶匙)
30 公斤	1,410 千卡	約 1,210 克	約 3 日	6.2 克	2.0 克 (約 3/4 茶匙)

注意事項

- 脂肪是胰臟炎飲食的關鍵。切勿另加任何油 (配方指定的葵花籽油除外)、牛油、肥肉、雞皮、動物內臟、芝士或奶類製品 - 一次意外的高脂餐就足以觸發復發。
- 建議少量多餐：每日分 3 至 4 餐，比一日兩餐更能減輕胰臟負擔。下表以每日兩餐計算，如分四餐請把每餐份量減半。
- 急性發作期必須即時求診 (嘔吐、腹痛、弓背、不肯進食)。本書配方為康復期及長期管理而設，不適用於急性期。
- 迷你雪納瑞、貴婦犬等容易有高血脂的品種，長期維持低脂飲食特別重要。
- 轉換餐單以 7 日漸進過渡，期間留意嘔吐、腹瀉、食慾及精神狀態。
- 建議定期覆檢胰特异性脂肪酶 (cPLI) 及三酸甘油脂，並按獸醫指示調整脂肪水平。
- 本配方為體重正常的成犬而設；同時有其他疾病 (如腎病、糖尿病) 的狗狗，請先諮詢獸醫。



長期管理・低脂 20 / 20

豬柳蛋白白飯餐（低脂長期管理）

全書份量最大的一款，一鍋接近 3.8

公斤。纖維極低、質地溫和，蛋白質適中，是長期管理組裡最好消化的其中一個。

本配方屬長期管理（低脂）組別。脂肪嚴格控制在每 1000 千卡 20 克 - 一般成犬糧約 40 至 60 克，即是說本配方大約只有三分之一。脂肪是引發胰臟炎的主要飲食因素，控制脂肪是整個餐單的核心。蛋白質為 114 克，以低脂高生物價來源為主；碳水化合物選用高消化率的白米，膳食纖維只有 2.5 克，屬低渣設計，減輕消化負擔。

材料（標準批量）

食材	份量	處理
豬柳（豬里脊）	2.1 公斤	切粒，切除所有可見脂肪
白米	400 克	洗淨
南瓜	600 克	去皮去籽切粒
蛋白	600 克（約 18 隻蛋的蛋白）	只用蛋白，蛋黃脂肪高不可使用
葵花籽油	30 克（約 6.7 茶匙）	熄火後拌入，份量必須準確

本批量煮成後約 3.8 公斤（能量約 4,249 千卡）。

製作步驟

1. 白米放入大湯鍋，加水蓋過，大火煮滾後轉中火煮 12 分鐘。
2. 加入豬柳（豬里脊），中火煮 10 至 12 分鐘至完全熟透。全程用水煮，切勿用油煎。
3. 加入南瓜再煮 5 分鐘至軟身。
4. 蛋白打散，熄火後徐徐倒入並不斷攪拌，利用餘溫令蛋白凝固成絮狀。
5. 拌入葵花籽油。份量請用量匙準確量度 - 這是配方唯一的油脂來源，多一點都會推高脂肪比例。
6. 連湯汁一起攤凍，按配量表分裝：3 日份量冷藏，其餘冷凍。

營養分析 (每 1000 千卡，未計補充品)

項目	每 1000 千卡	參考
脂肪	20 克	本組上限 25 克 (一般成犬糧約 40 至 60)
粗蛋白質	114 克	AAFCO 最低 45 克
碳水化合物	82 克	-
膳食纖維	2.5 克	低渣易消化
亞麻油酸 (必需脂肪酸)	6.3 克	AAFCO 最低 3.3 克
鈣 / 磷	1,318 / 1,098 毫克	鈣磷比 1.20:1

加入 蛋殼鈣粉 (每 1000 千卡約 3.3 克) 及 狗狗全方位保健粉 (每 1000 千卡約 7.5 克) 後，本配方已達到 AAFCO 成犬維持期營養標準的所有最低要求，可以長期作為主糧。這一點與腎病餐單不同：胰臟炎只需要控制脂肪，其他營養素完全不需要妥協。配方中的葵花籽油份量經過計算，用以達到必需脂肪酸 (亞麻油酸) 的最低要求，請勿省略。

餵飼及補充品配量表 (每日兩餐)

體重	每日能量需求	每日食量	本批可供	全方位保健粉 (每餐)	蛋殼鈣粉 (每餐)
3 公斤	251 千卡	約 220 克	約 17 日	1.0 克	0.4 克 (約 1/8 茶匙)
5 公斤	368 千卡	約 330 克	約 12 日	1.4 克	0.6 克 (約 1/4 茶匙)
10 公斤	619 千卡	約 550 克	約 7 日	2.3 克	1.0 克 (約 3/8 茶匙)
20 公斤	1,040 千卡	約 930 克	約 4 日	3.9 克	1.7 克 (約 5/8 茶匙)
30 公斤	1,410 千卡	約 1,260 克	約 3 日	5.3 克	2.3 克 (約 7/8 茶匙)

注意事項

- 脂肪是胰臟炎飲食的關鍵。切勿另加任何油 (配方指定的葵花籽油除外)、牛油、肥肉、雞皮、動物內臟、芝士或奶類製品 - 一次意外的高脂餐就足以觸發復發。
- 建議少量多餐：每日分 3 至 4 餐，比一日兩餐更能減輕胰臟負擔。下表以每日兩餐計算，如分四餐請把每餐份量減半。
- 急性發作期必須即時求診 (嘔吐、腹痛、弓背、不肯進食)。本書配方為康復期及長期管理而設，不適用於急性期。
- 迷你雪納瑞、貴婦犬等容易有高血脂的品種，長期維持低脂飲食特別重要。
- 轉換餐單以 7 日漸進過渡，期間留意嘔吐、腹瀉、食慾及精神狀態。
- 建議定期覆檢胰特異性脂肪酶 (cPLI) 及三酸甘油脂，並按獸醫指示調整脂肪水平。
- 本配方為體重正常的成犬而設；同時有其他疾病 (如腎病、糖尿病) 的狗狗，請先諮詢獸醫。

訂購補充品

本書配方必須配合以下兩款補充品，方能達到 AAFCO 完整標準，兩款均可在 dogalicious.com 訂購：

狗狗全方位保健粉 - 補回維他命與微量元素，用量因配方而異。

蛋殼鈣粉 - 補鈣並維持鈣磷比例，務必拌入食物一同餵飼。

沒時間每星期開爐？Dogalicious 胰臟消化護理處方鮮食同樣是低脂設計，由營養師配方，即熱即食。

更多配方與餵飼指南：dogalicious.com/狗胰臟炎食譜

重要：本書所有配方均符合 **AAFCO 成犬維持期標準**，可以長期餵飼，這一點與腎病餐單不同 - 胰臟炎需要控制的是脂肪，其他營養素不需要犧牲。但胰臟炎本身必須由獸醫診斷及跟進。**急性發作期間請立即求診**，那時狗狗需要的是治療，不是新食譜。轉換餐單前請先與獸醫商討，並按指示定期覆檢。

本書營養數值為按美國農業部食物成分資料庫計算的估算值，內容僅供一般參考，不能取代獸醫的專業意見。胰臟炎的治療方案必須由獸醫按個別情況制定。© Dogalicious 2026